

## Misurazione degli indicatori di prevalenza – bambini

---

### Legende dei grafici

Per la rappresentazione dei risultati si è optato per i grafici a imbuto. L'asse x (orizzontale) riporta il numero di casi inclusi, l'asse y (verticale) la frequenza percentuale dei decubiti sviluppati in ospedale. La linea rossa orizzontale segnala la media complessiva dei decubiti verificatisi negli ospedali partecipanti. Le linee blu (grafico a imbuto) rappresentano gli intervalli di confidenza del 95% in relazione al numero di casi inclusi. I cerchietti neri sono gli ospedali. Questa rappresentazione consente di raffigurare i casi inclusi per ciascun ospedale pediatrico: i grandi nosocomi con un numero elevato di casi si trovano a destra nel grafico, quelli più piccoli a sinistra.

La finestra pop-up riporta le informazioni seguenti:

- ospedale, sede;
- tasso di prevalenza standardizzato in %;
- tasso di risposta in %;
- numero di casi inclusi;
- eventuali commenti degli ospedali/delle cliniche.

Il decubito nosocomiale è classificabile come segue.

- Categoria 1: arrossamento della cute intatta che non sparisce alla digito-pressure
- Categoria 2: perdita parziale della cute
- Categoria 3: perdita della cute
- Categoria 4: perdita completa della cute o dei tessuti